***Benvenuti
State entrando nel percorso
NIPT,
test non invasivi di previsione
delle più frequenti malattie
genetiche***

Test
Prenatale
Non
Invasivo

NIPT – PGT2
PGT1

PluriGenTEST™

Property of
Lamberto Camurri Ph.D.

Numero casi (nati + IVG)	6849333	207225
Prevalenza anomalie congenite	2,37 % (1:42)	2,27 % (1:44)
Prevalenza anomalie cromosomiche	0,35 % (1:270)	0,32 % (1:312)

Causa importante di malformazioni congenite e ritardo psicomotorio sono alcune anomalie cromosomiche e sindromi genetiche che generano bambini affetti con una frequenza fra 1/900 e 1/10000 nati

Figure 3-23 Principles of Anatomy and Physiology, 11/e
© 2006 John Wiley & Sons

*La mappa dei 46 cromosomi presenta i tre che causano le principali anomalie cromosomiche compatibili con la sopravvivenza, trisomia **13**, **18**, **21***

La trisomia si forma da un errore di maturazione

dello spermatozoo

o dell'ovocita

alla fecondazione

Quando si uniscono per creare la prima cellula fetale di 46 cromosomi

**Il test sul DNA
fetale nel plasma
materno cerca la
presenza di
trisomie 13, 18 e
21 e dei
cromosomi X e Y
(causa dell'83%
delle anomalie
cromosomiche*)**

**Variano con età materna*

Il test sul DNA fetale nel plasma materno può anche cercare le anomalie strutturali del genoma, delezioni, duplicazioni e altro (causa del 17% delle anomalie cromosomiche*)

**Variano con età materna*

Il DNA fetale è presente nel sangue materno a partire dalla 10 settimana e deriva dalla placenta che perde le sue cellule morte nel sangue materno

Il test è una analisi diretta del DNA nel plasma materno con performances superiori al 99% per le trisomie

Trisomy 21	Trisomy 18	Trisomy 13
NIPT total 2013-2015	False positive rate/specificity	0.09%	0.13%	0.13%
	False negative Population rate False neg. /detection rate	0.08% 0.8%	0.06-0.12% 3.7%	0.18-0.36% 9%

ma non è un test diagnostico essendo eseguito su DNA sia materno che fetale presente nel sangue della donna.

Alcuni test non si limitano alla ricerca delle principali trisomie ma analizzano l'intero genoma cercando anche

	Trisomy 21 (n=7048)	Trisomy 18 (n=7048)	Trisomy 13 (n=7048)	SCA (n=7048)	Rare Trisomies (n=7048)	CNV (n=7048)
True Positive	58	9	6	20	8	6
False Positive	1	0	1	10	4	5
True Negative	6989	7039	7041	7018	7036	7037
False Negative	0	0	0	0	0	0
Sensitivity (95% CI)	100.00% (93.84% - 100.00%)	100.00% (66.37% - 100.00%)	100.00% (54.07% - 100.00%)	100.00% (83.16% - 100.00%)	100.00% (63.06% - 100.00%)	100.00% (54.07% - 100.00%)
Specificity (95% CI)	99.99% (99.92% - 100.00%)	100.00% (99.95% - 100.00%)	99.99% (99.92% - 100.00%)	99.86% (99.74% - 99.93%)	99.94% (99.85% - 99.98%)	99.93% (99.83% - 99.98%)
PPV (95% CI)	98.31% (90.91% - 99.96%)	100.00% (66.37% - 100.00%)	85.71% (42.13% - 99.64%)	66.67% (47.19% - 82.71%)	66.67% (34.89% - 90.08%)	54.55% (23.38% - 83.25%)
NPV (95% CI)	100.00% (99.95% - 100.00%)	100.00% (99.95% - 100.00%)	100.00% (99.95% to 100.00%)	100.00% (99.95% - 100.00%)	100.00% (99.95% - 100.00%)	100.00% (99.95% - 100.00%)

le anomalie strutturali. Non hanno ancora validazione ufficiale. Il PrenatalsafeKaryo (Genoma Roma) mostra specificità del 55% per le anomalie rare di stuttura.

La analisi del DNA della gestante è in grado di studiare alcune malattie genetiche frequenti verificando la condizione di portatrice sana della malattia che attiva il controllo successivo sul feto

Ricerca portatori malattie mendeliane

Fibrosi Cistica	portatori	1/25	nati	1/2500
Atrofia muscolare spinale		1/50		1/10000
Sordità NS		1/35		3% popol
Ritardo mentale FRAXA		1/260		1/1250M 1/2000F

PluriGenTEST™

Property of
Lamberto Camurri Ph.D.

Cronologia delle indagini fetali non invasive

Property of
Lamberto Camurri Ph.D.

Questa presentazione non sostituisce la obbligatoria consulenza genetica pre test

Numero casi (nati + IVG)	6849333	207225
Prevalenza anomalie congenite	2,37 % (1:42)	2,27 % (1:44)
Prevalenza anomalie cromosomiche	0,35 % (1:270)	0,32 % (1:312)

Ministero della Salute
Consiglio Superiore di Sanità
Sezione I

Linee-Guida

Screening prenatale non invasivo basato sul DNA
(Non Invasive Prenatal Testing – NIPT)

Nei plasma materno in gravidanza sono presenti cellule fetali ricche in DNA libero (fDNA) derivanti dal placenta e dalla circolazione fetale.

Maggio 2015

Consulenza genetica